

**BASAGRAN SG****Myyntipäällyksen teksti****Rikkakasvien torjuntaan****Vaara**

Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring.

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

**Tehoaine:** bentatsoni 870 g/kg

**Valmistetyyppi:** SG

**Käyttäjärhmä:** Ammattikäyttäjät

**Käyttötarkoitus:**

Rikkakasvien torjuntaan apilaa tai sinimailasta sisältävistä nurmista ja niiden suojaviljoista, vilja-herne-seosviljoista, apila- ja sinimailasviljelyksiltä, palkokasvi-, avomaankurkku-, pellava-, istukas- ja taimisipuli- sekä mäkikuisma- ja viljelyksiltä.

**Käytön rajoitukset:**

Ei saa levittää reppuruiskulla.

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueuokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

**Suojainohjeet:**

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojaapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

**Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojele:**

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Suojaetäisyys eri suutintyypeillä		
Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet	
	50 %	vähintään 75 %
5 m	3 m	0 m

**Käyttöohje:**

1. Suojaviljan kanssa tai ilman sitä perustettavat apilaa tai sinimailasta sisältävät nurmet sekä apila- ja sinimailasviljelykset ruiskutetaan kylvövuonna, kun sinimailasessa tai apilassa on sirkkalehtien lisäksi 1-3 kasvulehteä tai, kun heinän oras on 2-3 -lehtiasteella.
2. Vilja-herne-seosvilja käsitellään, kun vilja on 2-3 -lehtivaiheessa ja herne 5-8 cm:n korkuista.
3. Apilaa tai sinimailasta sisältävät nurmet sekä apilan ja sinimailasen siemenviljelykset ruiskutetaan aikaisin keväällä kasvun alettua. Alhainen lämpötila (alle +12 - +13 °C) ruiskutuksen jälkeisinä päivinä hidastaa ja heikentää tehoa.
4. Herne käsitellään aikaisella taimiasteella hernekasvuston ollessa 5-8 cm:n korkuista.
5. Härkäpapu käsitellään aikaisella taimiasteella, kun siinä on 2-4 kasvulehteä ja pensaspapu, kun siinä on 2 kasvulehteä.
6. Istukas- ja taimisipuli käsitellään sipulin 3-4 -lehtivaiheessa. Ei sovellu varhaisviljelyyn.
7. Avomaankurkku käsitellään, kun taimessa on 1-2 kasvulehteä, tavallisesti 3-4 viikon kuluttua kylvöstä. Ruiskutuksen saa tehdä vasta 5 - 7 vrk harson poistamisen jälkeen.
8. Pellava käsitellään 5-6 cm:n korkuisena.
9. Mäkikuisma käsitellään kylvö- tai istutuskesänä sen ollessa vähintään 3 cm:n korkuista.

**Käyttömäärät:**

sinimailanen	1,4-1,7	kg/ha
apilaa tai sinimailasta sisältävät nurmet	1,1-1,7	"
apilan siemenviljelykset	1,1-1,7	"
vilja-herne-seosvilja	1,1-1,7	"
herne, härkäpapu ja pensaspapu	1,1-1,7	"
istukas- ja taimisipuli	1,1	"
avomaankurkku	1,4-1,7	"
pellava	1,4-1,7	" + Sito Plus 0,2 l/ha
mäkikuisma	1,1-1,4	"

Vettä käytetään 300-400 l/ha.

Alhaisinta ohjeenmukaista käyttö määrää käytetään vain ruiskutettaessa aikaisessa vaiheessa hyvissä olosuhteissa.

**Huomautukset:**

Vaarallista muille viljelykasveille, myös virnoille. Valmiste on kosketusvaikutteinen ja tehoa parhaiten siemenrikkakasvien taimiin sirkkalehtiasteelta 2-3 -lehtiasteelle saakka. Tehoa hyvin peltomataraan, saunakukkaan, kamomillasaunioon, ristikukkaisiin rikkakasveihin, pihatähtimöön ja peltohatikkaan. Teho savikkaan ja pillikkeisiin vaihtelee. Teho on paras kostealla ja lämpimällä säällä (väh. +15 °C), kun rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa. Suositeltavinta on ruiskuttaa aamulla tai illalla. Viljelykasvin vioitusriski lisääntyy hyvin lämpimällä säällä. Pensaspapua ja avomaankurkkua ei vioitusriskin vuoksi saa ruiskuttaa aurinkoisella säällä. Ruiskutuksen jälkeen tulee olla sateetonta vähintään 6 tuntia. Yöhallan uhatessa ja sen jälkeen ei saa ruiskuttaa. Vaikutus rikkakasveihin alkaa näkyä n. viikon kuluttua ruiskutuksesta.

Mäkikuismalle valmiste saattaa aiheuttaa vähäistä lehtien punertumista / kellertymistä. Käyttö on kielletty mäkikuisman sadonkorjuukautena. Säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa.

**Luvanhaltija:** xxx

**Edustaja Suomessa:** xxx

**Rekisterinumero:** 1755

**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** xxx

**Nettopaino tai -tilavuus:** 000

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 8.11.2011.