

Vibrance Trio

Kasvitautilien torjuntaan

Varoitus, Varning



Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Epäillään aiheuttavan syöpää. Misstänks kunna orsaka cancer.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/...VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/...

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Valumat on kerättävä. Samla upp spill.

Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Älä käytä kasvinsuojeluainetta, jos olet raskaana. Sisältää tebukonatsolia. Använd inte växtskyddsmedel om du är gravid. Innehåller tebuconazole

Tehoaineet: sedaksaani 25 g/l, fludioksoniili 25 g/l, tebukonatsoli 10 g/l
sisältää myös 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

Valmistetyyppi: FS

Käyttäjärühmä: ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Syys- ja kevätehnän, rukiin, ruisehnän, syys- ja kevätohran sekä kauran siemenen peittaukseen siemen- ja maalevintäisten tautien torjumiseksi.

Käytön rajoitukset:**Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.

Vesieliövaikutusten vuoksi siemeniä peitattaessa, valmisteella käsitellyjä siemeniä kylvettäessä ja kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi valmisteella peitattua siementä ei saa kylvää tärkeille tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueille (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen peitatuilla siemenillä viljelemätön suojavyöhyke. Valmisteella peitatus siemenen viljelyä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi valmisteella peitatus siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan ja varmistaa, että siemen sekoittuu maaperään myös vakojen päässä. Mahdollisesti ylijääneitä peitattuja siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla.

Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote on poistettava.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Resistenssin hallinta:

Vibrance Trio –valmisteessa on kolme eri tavoin vaikuttavaa tehoainetta. Fludioksoniili kuuluu vaikutustavaltaan FRAC-ryhmään (Fungiside Resistance Action Committee) 12, sedaksaani ryhmään 7 ja tebukonatsoli ryhmään 3. Ryhmän 12 fungisidien riski resistenttien sienikantojen muodostamiselle on matala tai keskinkertainen, ryhmän 7 keskinkertainen tai korkea ja ryhmän 3 keskinkertainen. Resistenttien sienikantojen synnyn ehkäisemiseksi kannattaa vuorotella eri vaikutusmekanismin omaavien, kuhunkin kasvitautiin hyvin tehoavien valmisteiden välillä.

Käyttöohje:

Vilja peitataan nestepeittauslaitteessa kyseisen laitteen käyttöohjeen mukaisesti ulkona tai rakennuksessa, jossa on hyvä tuuletus. Koska eri valmisteiden juoksevuus vaihtelee ja lämpötila vaikuttaa annostelupumppujen kapasiteettiin, on peittauslaitteisto kalibroitava ennen peittaustyön aloitusta. Valmistetta voi käyttää 0 °C asti.

Peitattuja siemeniä sisältävien pakkausten merkitseminen:

Peitattuja siemeniä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu peittauksesta ilmoittavalla lipukkeella ”Sisältö käsitelty herkistävällä ja mahdollisesti syöpää aiheuttavalla Vibrance Trio-valmisteella. Tehoaineet sedaksaani, fludioksoniili, tebukonatsoli. Saadaan käyttää vain viljelytarkoituksiin. Siementä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä ja A2/P2 hengityksensuojainta. Älä saastuta vesiä peitatulla siemenellä tai sen pakkauksella.

Vesiliövaikutusten vuoksi valmisteella käsiteltyjä siemeniä kylvettäessä ja kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi valmisteella peitattua siementä ei saa kylvää (käyttää) tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen peitatuilla siemenillä viljelemätön suojavyöhyke. Valmisteella peitatun siemenen viljelyä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi valmisteella peitatut siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan ja varmistaa, että siemen sekoittuu maaperään myös vakojen päässä. Mahdollisesti ylijääneitä peitattuja siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla.

Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote on poistettava.

Myyntipakkaus viedään asianmukaiseen jätepiesteeseen.

Käyttömäärät:

Viljelykasvi	Taudinaiheuttaja	Annos l/100 kg siementä
Vehnä	Lumihome, siemenlevintäinen (<i>Monographella nivalis</i>) Ruskolaikku (<i>Stagonospora nodorum</i>) Itävyyttä heikentävät homesienet (<i>Fusarium culmorum</i> , <i>Fusarium graminearum</i>) Haisunoki (<i>Tilletia caries</i>) Lentonoki, vehnä (<i>Ustilago tritici</i>) <i>Rhizoctonia cerealis</i> (tyvitauti) Taimipolte (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0,2
Ohra	Lumihome, siemenlevintäinen (<i>Monographella nivalis</i>) Kätkönoki, ohran (<i>Ustilago hordei</i>) Pahkasieni (<i>Typhula incarnata</i>)	0,2
	Lentonoki, ohran (<i>Ustilago nuda</i>) Viirutauti (<i>Pyrenophora graminea</i>) Itämistä haittaavat homesienet	0,15 - 0,2
Ruisvehnä	Lumihome, siemenlevintäinen (<i>Monographella nivalis</i>)	0,2
Kaura	Lentonoki, kauran (<i>Ustilago avenae</i>)	0,15

Ruis	Lumihome, siemenlevintäinen (<i>Monographella nivalis</i>) Korsinoki, rukiin (<i>Urocystis occulta</i>)	0,2
------	--	-----

Huomautukset:

Valmiste on sekoitettava/ravistettava huolellisesti ennen käyttöä.
Peittauslaitteet puhdistetaan lämpimällä vedellä. Puhdistusveden voi käyttää peittaukseen. Mikäli samalla peittauskoneella käytetään muita kuin vesipohjaisia peittäusaineita, tulee laite puhdistaa esimerkiksi etanolilla valmistetyyppeä vaihdettaessa.

Varastointilämpötila – 5 - + 35 °C.

Luvanhaltija:**Valmistaja ja pakkaaja:****Rekisterinumero:** 3276**Nettobilavuus:****Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:**

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena.